

RECEPTURA III ROK

1. 10 czopków doodbytniczych zawierających 10% anestezyne (Anaesthesinum).

Rp.

Anaesthesini 0,2 *← 10% procent*

Olei Cacao ad 2,0

Misce fiat suppositorium anale

Dentur tales doses Nr X *← służy do zrobienia Receptur*

Da signa w razie bólu

2. 20 czopków doodbytniczych o działaniu rozkurczowym zawierających papawerynę.

alle każdego czopka

Rp.

Papaverini hydrochlorici 0,04

Olei Cacao ad 2,0

Misce fiat suppositorium anale

Dentur tales doses Nr XX

Da signa w razie bólu

1,0 alle czopki

3. 6 proszków dzielonych o działaniu rozkurczowym zawierający papawerynę.

a
Rp.

Papaverini hydrochlorici 0,18

Sacchari lactis ad 3,0

Misce fiat pulvis

Divide in partes aequales Nr VI

Da signa w razie bólu

b
Rp.

Papaverini hydrochlorici 0,03

Sacchari lactis ad 0,5

Misce fiat pulvis

Dentur tales doses Nr VI

Da signa w razie bólu

4. 20 proszków dzielonych o działaniu rozkurczowym zawierający wyciąg z liści pokrzyki (Extractum Belladonnae siccum).

Rp.

Extracti Belladonnae sicci $\frac{0,015}{0,5}$

Sacchari lactis ad

Misce fiat pulvis

Dentur tales doses Nr XX

Da signa w razie bólu

Rp.

Extracti Belladonnae sicci 0,3

Sacchari lactis ad 10,0
Misce fiat pulvis
Divide in partes aequales Nr XX
Da signa w razie bólu

5. Zasyпка zawierająca 3% kwas salicylowym i 5% kwas borny.

Rp.
Acidi salicylici 3,0
Acidi borici 5,0
Talci ad 100,0
Misce fiat pulvis
Da signa zewnętrznie

6. Zasyпка zawierająca 5% kwas tanninowy (Acidum tannicum).

Rp.
Acidi tannici 5,0
Talci ad 100,0
Misce fiat pulvis
Da signa zewnętrznie

7. Roztwór wodny zawierający kodeinę z syropem, dawkowany 4 razy dziennie łyżeczką.

*3 x naj wle
przez 3 dni*

Rp.
Codeini phosphorici 0,24
Sirupi simplicis 10,0
Aquae destillatae ad 60,0

8. Roztwór wodny zawierający kodeinę z syropem, dawkowany 4 razy dziennie łyżką stołową.

przez 3 dni

Rp.
Codeini phosphorici 0,24
Sirupi simplicis 30,0
Aquae destillatae ad 180,0

90mg kodeiny / łyżeczka

9. Krople zawierające kodeinę, dawkowane 4 razy dziennie po 20 kropli.

przez 3 dni

Rp.
Codeini phosphorici 0,24
Aquae destillatae ad 12,0
Misce fiat guttae
Da signa 4 razy dziennie po 20 kropli

10. Krople zawierające kodeinę, dawkowane 4 razy dziennie po 10 kropli.

przez 3 dni

Rp.
Codeini phosphorici 0,24

Aquae destillatae ad 6,0
Misce fiat guttae
Da signa 4 razy dziennie po 10 kropli

11. Maść zawierająca 15% mentolu.

Rp.
Mentholi 15,0
Vaselini flavi ad 100,0
Misce fiat unguentum
Da signa zewnętrznie

12. Maść zawierająca 5% anestetyny.

Rp.
Anaesthesini 5,0
Vaselini flavi ad 100,0
Misce fiat unguentum
Da signa zewnętrznie

do oko vaselin
albi

do oko 10g.
wersi do 10g

13. Nalewka uspokajająca z walerianą.

Rp: NN:
Tinctura Valerianae 5,0
Da signa 25 kropli w razie potrzeby

14. Nalewka z opium.

Rp.
Tinctura Opii 5,0
Da signa 20 kropli w razie bólu

0,2
liżenie bólu 20 kropli