

Cywilizacja i częstota RDS  
wiedotlenienie dostopor  
cigae cesarskie przed podjęciem decyzji poroda  
wskazywa u matki.

Powiazi

- krwawienie wewnątrzmaciczne lub dostoporodowe u 40%  
z 34 tyg

- I st. pod wysiękły 40%  
• II st. do 10%  
• III st. do 10% z ich poszerzeniem  
• IV st. także do 10% otaczających kawy

- Obj. kliniczne

bezdech zab. świadomości bradykardia ciotności  
wstrząs zab. termoregulacji

- Powikłania

wodogłowie poliwodocenne  
rozległe dostoporodowe wazg  
zpo4

Retinopatia wcześniaków - odwarstwienie siatkówki.  
na skutek rozszerzenia naczyń pod wpływem zbyt  
dużego st. hemu.

26.04.06

## NOWORODEK

① • Długość - od 1 dnia 38 tyg do ostatniego 42 tyg.

Wyznaczenie daty porodu - reguła Negellego  
Pierwszy dzień ostatniej + 1 rok - 3 msc + 7 dn. = ostatni dzień 40 tyg.  
miesiączki.

② • Wczesniaki - wcześniaki:

- < 28 tyg. nie wcześniaki
- > 28 tyg wcześniaki

Wśród wcześniaków częściej przeżywają ♀.

③ • Pneumozony

Krzepnąc swoje tkanki bo szybko staje się niewydolne.  
Często problemy jak u wcześniaka (z wyj. ukł. oddychawczego).

### Ad. 1

- waga: ~~2,5~~ 2,5-4,0 kg. Ciężkie dzieci - matki z cukrzycą, płód jest narazony na hipoplazję

- przewaga mm. szpary

- < 2,5 kg = hipo- lub dystroficzny

(< 2,0 kg) gdy < 10 centym (czyli odnośnie do wzrostu).

Dystrofia:

• symetryczna: cięde i krótkie przyni  
zaczęła cięde i wczesnie

- wody płucne

- razi. wewnątrzmac.

- zesp. poalkoholowy

• asymetryczna: cięde i długie

- zatknięcie szpary

- inf. wewnątrzmac. w III trym

- mikotyuzia

- NT u matki

- długość: 50-55 cm

- obwód piersi 2 cm większy niż KLP

- skóra dojrzała, meszek płodowy do 1/3 górnej

pleców

- cięde przednie i tylne (u wcześniaków także

boczne

- płytki paronichowe (nawodniaki u do końca)

- brzdękowane dłoni i stóp ( wcześniaki tylko palce)

- u wcześniaka płaszcz uszy

- im. wrodzony

- dojrzałość naczyń płucnych: igara w mosznie,

wonpi słowowe większe pełnywojz, mniejsze (u wcześ.

"wonpi siejgce" - wate wystajz).

- przy odrodz

- chwyty - Moro - pisanie

- odrzuci ssania i potykania

Owca wielu biologicznego

Skala Ballard - jak wyglada noworodek. Bo są różnice ze skalą Negellego. Bierz się pod uwagę cedy

30.10.20  
fizyczne (win: skóra, uszka, wągdy płciowe) oraz  
neurologiczne.

Ad 2

Powiczywy

- ch. uszki: wady rozwojowe, zapalenie wągdu rodowego, pestoza, przedwczesne oddzielenie się zoryska, zoryskus przedwzrost, starszy lub zbyt młody wiek (optimum 20-28 rż)
- ch. piody: wady rozwojowe, zakażenia

Niedojrzałość ON

- brak prawidłowej neuroregulacji co może prowadzić do zab. kręzenia i oddych.
- brak lub osłabienie odruchów uwarunkowanych
- obniżenie napięcia mięśniowego
- brak koordynacji odruchów ssania, polykani'a i oddych.

Niedostateczna cykliczność snu

- niedobroistość (bo u piodu wątroba jest wągdem <sup>krwiotwórczym</sup>)

Niedojrzałość pneo.pok.:

- zab. przyswojenia tłuszczów i witamin w nich rozpuszczalnych
- niedojrzałość wątroby
  - dotychczas fizjologiczna - przedłużona i b. intensywna
  - zab. ulit. kuperacji (wcz. zesp. protroubiny)

więc podojemny wit. K (długie tempo został ograniczony problem ch. krwotocznej noworod.

donoszony	} bimbina
12 up %	
15 up %	

Nerki

- oburki lub odwod
- fizjologiczny u mc
- kwasica z hiperkalcemią

Hipokalcemia, hipofosfemia, hiponatremia, lipoproteinemia

Słabsza odporność na zakażenia (mniejsza ilość p.cier przekazanych przez matkę, ↓ odporność humoralna i komórkowa)

Zab. termoreg.

Niedojrzałość uli. oddych. → zesp. zaburzeń oddychania.

Mózgowe porażenie dziecięce:

trwałe, niepostępujące porażenie ON powstałe w ciąży, przy porodzie lub bezpośrednio po uciu. Najbardziej wrażliwa jest skóra niedowa. Najczęściej skutek niedokrwienia.

Częstość niewyd

- ~ 28 tyg 60% ma ostrą
- 32-36 15-20
- donoszone 0,01%