

Imię i nazwisko..... Grupa..... Nr albumu.....  
Data.....

### Kolokwium z onkologii klinicznej

#### Zaznacz jedną prawidłową odpowiedź:

1. W raku gruczołu krokowego stopień złośliwości histologicznej oznacza się według klasyfikacji:
  - a. Blooma i Richardsona
  - b. Clarka
  - c. WHO
  - d. Gleasona
  
2. W profilaktyce wtórnej raka piersi największe zastosowanie ma:
  - a. zaniechanie palenia tytoniu
  - b. samokontrola piersi
  - c. badania mammograficzne
  - d. kontrolne badanie palpacyjne przez ginekologa
  
3. Standardowe leczenie powierzchniowego raka pęcherza moczowego to:
  - a. radykalna cystektomia
  - b. radioterapia
  - c. elektroresekcja przezcewkowa z następową terapią dopęcherzową
  - d. chemioterapia
  
4. Radioterapia w leczeniu raka piersi z zachowaniem gruczołu piersiowego (BCT) jest wskazana:
  - a. w każdym przypadku
  - b. wyłącznie przy lokalizacji guza w kwadrantach bocznych
  - c. wyłącznie w razie zajęcia węzłów pachowych
  - d. u chorych w młodym wieku
  
5. Zaznacz stwierdzenie **falszywe**. Zwiększone ryzyko wystąpienia raka endometrium występuje u:
  - a. wieloródek
  - b. otyłych
  - c. chorych na cukrzycę
  - d. kobiet z nadciśnieniem tętniczym
  
6. Do głównych czynników ryzyka rozwoju raka szyjki macicy należą:
  - a. wczesne rozpoczęcie życia seksualnego
  - b. infekcje wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)
  - c. bezdzietność
  - d. prawdziwe a i b

7. Palenie papierosów zwiększa ryzyko zachorowania na raka z wyjątkiem:
- a. raka krtani
  - b. raka nerki
  - c. raka jądra
  - d. raka pęcherza moczowego
8. U 70-letniego mężczyzny w badaniu przesiewowym stwierdzono wzrost poziomu PSA do 11 ng/ml bez nieprawidłowości w badaniu palpacyjnym per rectum. Zalecane postępowanie diagnostyczne będzie polegać na:
- a. chory nie wymaga diagnostyki
  - b. uważnej obserwacji i kontroli PSA co 3 mies.
  - c. wykonaniu klasycznej wersji biopsji gruboigłowej pod kontrolą USG transrektalnego
  - d. wykonaniu wycięcia prostaty
9. Nowotwory jądra:
- a. najczęściej występują w 6 dekadzie życia
  - b. dają bóle moszny u 70% chorych
  - c. są rozpoznawane na podstawie biopsji jądra
  - d. są najczęściej nowotworami zarodkowymi
10. Optymalne postępowanie u chorego na raka drobnokomórkowego płuca w postaci ograniczonej to:
- a. obserwacja
  - b. skojarzona radiochemioterapia
  - c. wyłączna chemioterapia
  - d. leczenie chirurgiczne
11. W którym z wymienionych niżej nowotworów stosuje się leczenie hormonalne:
- a. rak jądra
  - b. rak jajnika
  - c. rak prostaty
  - d. rak żołądka
12. Wśród czynników ryzyka zachorowania na raka wątrobowokomórkowego nie wymienia się:
- a. nadużywania alkoholu
  - b. marskości wątroby
  - c. palenia tytoniu
  - d. zakażenia wirusami zapalenia wątroby
13. Wskaż zdanie **falszywe** dotyczące raka nerki:
- a. palacze tytoniu częściej chorują na raka nerki
  - b. chemioterapia adjuwantowa jest standardową metodą leczenia raka nerki
  - c. w przypadku stwierdzenia guza nerki nie należy wykonywać biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej
  - d. rakowi nerki może towarzyszyć leukocytoza, poliglobulia lub nadciśnienie tętnicze.
14. Szpiczaka mnogiego lub przerzuty guza litego do kości podejrzewa się, gdy chory zgłosi:
- a. objawy tężyczki i bóle kości

- b. osłabienie, zaparcia, bóle kości
  - c. krwimocz z białkomoczem i bóle kości
  - d. objawy tężyczki i niedokrwistość
15. W przypadku podejrzenia raka piersi w badaniu klinicznym negatywny mammograf jest gwarancją nieobecności nowotworu
- a. prawda
  - b. fałsz
16. Najbardziej przydatne w raku jelita grubego jest oznaczanie:
- a. HCG
  - b. CA-125
  - c. CEA
  - d. AFP
17. Radioterapię stosuje się w raku:
- a. okrężnicy wstępującej
  - b. poprzecznicy
  - c. esicy
  - d. odbytnicy
18. Które z powyższych zdań dotyczących raka jelita grubego jest **fałszywe**:
- a. za przyczynę polipowatości rodzinnej uważa się mutację genu APC
  - b. najważniejszym czynnikiem rokowniczym w raku jelita grubego jest stopień zaawansowania nowotworu według klasyfikacji Gleasona
  - c. pierwszym objawem guza kątnicy może być guz w prawym dole biodrowym
  - d. niezbędnym elementem każdej operacji radykalnej raka odbytnicy jest usunięcie mezorektum
19. Jednym z najczęściej występujących nowotworów u młodych mężczyzn (20-40 rok życia) jest:
- a. rak prostaty
  - b. rak nadnercza
  - c. rak jądra
  - d. rak pęcherza moczowego
20. Teleradioterapia to:
- a. radioterapia promieniami o małej energii
  - b. radioterapia promieniami o wysokiej energii
  - c. radioterapia ze źródeł zewnętrznych
  - d. radioterapia promieniami elektromagnetycznymi